

## Inälvsmask

Inälvsmask är parasiter som ger obehag hos hundar och katter. Vanliga symtom är allmän slöhet, diarré, viktminskning, kräkningar och glanslös päls. Men det är ändå inte så lätt att upptäcka inälvsmask. Vuxna djur kan vara angripna utan att visa yttre tecken på sjukdom.



## Din hund

### Spolmask

Den parasit som oftast förekommer hos hundar i Sverige är spolmask. Den förekommer hos de allra flesta nyfödda valpar och i varierande grad hos vuxna hundar. Därför behöver alla valpar avmaskas.

### Andra inälvsmaskar

Hakmask och bandmask är andra maskar som kan förekomma. Dessa typer är sällsynta hos hundar i Sverige, och rutinbehandling är inte nödvändig. Vid misstanke om förekomst av dessa parasiter bör Du ta kontakt med Din veterinär för att få ett lämpligt behandlingsprogram.

## Banminth<sup>®</sup> vet. till hund

**Valparna** behandlas vid ca 2 veckas ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.

**Tiken** behandlas samtidigt med valparna.

**Unghundar** behandlas vid 3 och 6 månaders ålder.

**Vuxna hundar** behandlas vid påvisad förekomst av spolmask och behandlingen upprepas efter 10-14 dagar.

Rutinmässig avmaskning av vuxna hundar kan vara motiverad i miljö med högt smittryck, ex kennlar. I dessa fall bör ett avmaskningsprogram utarbetas i samråd med veterinär.



## Din katt

### Inälvsmask

De vanligaste parasiterna hos katt i Sverige är spolmask och bandmask. Spolmasken smittar via modersmjölken, infekterade katter och bytesdjur. Bandmask förekommer hos utekatter som jagar möss och råttor. Vid misstanke om bandmask bör Du komplettera behandlingen med ett medel verksamt mot bandmask.

## Banminth<sup>®</sup> vet. till katt

**Kattungar** behandlas vid ca 2 veckors ålder och därefter vid 4,6,8,10 och 12 veckors ålder.

**Kattan** behandlas samtidigt med ungarna.

**Ungkatter** upp till 2-3 års ålder behandlas en gång per kvartal.

**Vuxna katter** behandlas vid påvisad förekomst av spolmask och behandlingen upprepas efter 10-14 dagar.

Rutinmässig avmaskning av vuxna katter kan vara motiverad i miljö med högt smittryck, ex katterier. I dessa fall bör ett avmaskningsprogram utarbetas i samråd med veterinär.

## Apoteket rekommenderar smalspektrum

Enligt rekommendationer från veterinärmedicinsk expertis och Apoteket AB bör unga hundar och katter avmaskas med rätt doserade medel som slår mot specifika masksorter för att undvika resistensutveckling<sup>1</sup>.



Ref. 1 "Avmaskning av hund och katt" broschyr framtagen av Apoteket AB, Aug. 2000. I samråd veterinärmedicinsk expertis

## Banminth® vet.

Banminth® vet. har ett smalt spektrum och är effektivt mot spolmask och hakmask.

Tolereras väl - liten risk för överdosering.

Enkelt att ge - väl smakande pasta.

En dos per behandlingstillfälle.

Receptfritt på Apoteket.

## Förpackningar

Banminth® vet. pasta finns i tub eller dosspruta i olika storlekar. Produkten är speciellt utvecklad till varje djurslag.

Var därför uppmärksam på vilken typ av Banminth® vet. Du köper på apoteket.

## Till hund

### 10 g tub

(räcker till hund som väger 15 )

### 16 g dosspruta

(räcker till hund som väger 24 kg)

### 24 g tub

(räcker till hund som väger 36 kg)

### 10 x 24 g tub

## Till katt

### 2 g dosspruta

(räcker till katt som väger 4 kg)

### 3 g dosspruta

(räcker till katt som väger 6 kg)

# Avmaska lätt på rätt sätt



För ytterligare information  
besök vår hemsida  
[www.orion.se/ah](http://www.orion.se/ah)

Marknadsförs i Sverige av:

**ORION  
PHARMA**  
ANIMAL HEALTH  
Box 334, 190 30 Sollentuna  
Tel: 08-693 64 60, Fax: 08-693 64 60

Mar 2002



Tillverkare:

Animal Health

**Banminth® vet.**  
pyrantelpamoat