



FLUBENOL KH PASTA



**ODČERVENÝ
PES A KOČKA = MAJITEL V BEZPEČÍ**

***Anthelmintikum v pastě (flubendazol)
pro léčbu smíšených invazí vyvolaných
hlísticemi a tasemnicemi u psů a koček.***

FLUBENOL KH

PASTA



ORION
PHARMA

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ZODPOVĚDNÉHO ZA UVOĽŇOVÁNÍ ŠARŽÍ, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie

Výrobce zodpovědný za uvolňování šarží:

Janssen-Cilag SpA

via C. Janssen, 04010 Borgo San Michele, Latina, Itálie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flubenol KH 44 mg/ml perorální pasta.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bílé až smetanově žluté gelovité pasty obsahuje:

Léčivá látka: Flubendazolium 44 mg

Pomocné látky: Methylparabenum (E 218) 1,8 mg

Propylparabenum (E 216) 0,2 mg

4. INDIKACE

Léčba endoparazitóz u psů a koček způsobených:

Škrkavkami *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*

Měchovci *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*,

Ancylostoma tubaeforme

Tenkohlavcem *Trichuris vulpis*

Tasemnicemi *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*,

Hydatigera taeniaeformis

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy. Flubenol KH pasta je bezpečný pro podávání březím a laktujícím zvířatům.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Psy a kočkami je Flubenol KH velmi dobře snášen. U některých koček může podání tohoto přípravku vyvolat salivaci, která je způsobena stresem zvířete z manipulace. Toto nemá vliv na léčebný účinek přípravku. U psů můžeme příležitostně pozorovat přechodné zvracení.

7. CÍLOVÉ DRUHY

Psi a kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

22 mg/kg živé hmotnosti = 1 ml na 2 kg živé hmotnosti.

- Psi a kočky infikovaní pouze škrkavkami a měchovci:

1 ml pasty na 2 kg živé hmotnosti, jednou denně po 2 po sobě jdoucí dny.

- Psi a kočky infikovaní smíšenou infekcí parazitů:

1 ml pasty na 2 kg živé hmotnosti, jednou denně po 3 po sobě jdoucí dny.

Pasta může být podávána jedním z následujících způsobů:

- správná dávka je podána přímo do dutiny ústní psa nebo kočky,

- správná dávka je zamíchána do krmiva (tato metoda je doporučována u agresivních zvířat).

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Odstraňte bezpečnostní zátku (3). Přidržete píst (1) a otáčejte prstýnkem (2) proti směru hodinových ručiček až k číslu, které koresponduje s hmotností zvířete v kg. Dávka pro zvíře. Při následující léčbě přičtete hmotnost zvířete k číslu, u něhož se nachází prstýnek a ten přesuňte otáčením k této nové hodnotě dávky.



Například: pro 3 kg kočku, prstýnek nařídíte k hodnotě 3 kg pro první léčbu, k 6 kg pro druhou a k 9 kg pro třetí.

Doporučená léčba:

Psi	
štěňata	okolo 1.-2. týdne stáří
mladí psi	při odstavu a následně každé 2-3 měsíce
feny	během hárání 10 dní před a 10 dní po porodu
dospělí psi	3 krát až 4 krát ročně
všichni psi	před vakcinací

Kočky	
koťata	ve stáří 6 týdnů
mladé kočky	každé 2-3 měsíce
dospělé kočky	3 krát až 4 krát ročně
všechny kočky	před vakcinací

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2009