

ORION  
PHARMA



# ZANTEL VET



**100 tablet**



**Širokospektré dvousložkové anthelmintikum  
(praziquantel + fenbendazol) pro léčbu smíšených  
invazí vyvolaných hlísticemi a tasemnicemi u psů.**

**ODČERVENÝ PES = MAJITEL V BEZPEČÍ**

Orion Oyj organizační složka, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha, tel.: +420 227 027 263, fax: +420 227 230 661

[www.orionvet.cz](http://www.orionvet.cz)

# ZANTEL VET

## 100 tablet



### ORION PHARMA

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:  
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland.

**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Zantel

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

Jedna tableta obsahuje :

Praziquantelum 50,0 mg  
Fenbendazolium 500,0 mg

**4. INDIKACE**

Širokospektré anthelmintikum pro léčbu smíšených invazí vyvolaných hlísticemi a tasemnicemi u psů.

**Skrkavky** *Toxocara canis* (vývojová stadia, dospělci)

*Toxascaris leonina* (vývojová stadia, dospělci)

**Měchovci** *Uncinaria stenocephala* (vývojová stadia, dospělci)

*Ancylostoma caninum* (vývojová stadia, dospělci)

**Tenkohlavci** *Trichuris vulpis* (dospělí jedinci)

**Tasemnice** *Echinococcus granulosus*  
*Echinococcus multilocularis*

*Dipylidium caninum*

*Taenia pisiformis*

*Taenia hydatigena*

**5. KONTRAINDIKACE**

Zantel by neměl být podáván štěňatům mladším než 2 týdny.

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

U psů po podání doporučené dávky bylo zaznamenáno zvracení. Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi

**8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Tablety Zantel se podávají perorálně, buď přímo nebo zamíchané v porci masa nebo uzeniny nebo smíchané s krmivem. Dietetická opatření nebo hladovka nejsou nutná. Živá hmotnost by měla být stanovena co nejpřesněji jak je možné z důvodů dodržení správné dávky.

**Léčba dospělých psů a odstavených štěňat**

Zantel má být podáván v dávce 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg živé hmotnosti psa (což odpovídá 1 tabletě na 10 kg ž.hm.) denně, ve dvou po sobě následujících dnech.

Například:

Malí psi a odstavená štěňata	
0,5 – 2,5 kg živé hmotnosti	¼ tablety
2,5 - 5 kg živé hmotnosti	½ tablety
6 - 10 kg živé hmotnosti	1 tableta

Středně velcí psi	
11 - 15 kg živé hmotnosti	1½ tablety
16 - 20 kg živé hmotnosti	2 tablety
21 - 25 kg živé hmotnosti	2½ tablety
26 - 30 kg živé hmotnosti	3 tablety

Velcí psi	
31 - 35 kg živé hmotnosti	3½ tablety
36 - 40 kg živé hmotnosti	4 tablety

Studie nebyly prováděny u psů s živou hmotností vyšší než 40 kg

**9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Viz bod 8

**10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Není určeno pro potravinová zvířata.

**11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávat mimo dosah dětí.

**12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.

**13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

**14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Únor 2009

**15. DALŠÍ INFORMACE**

Velikosti balení:

Lahev: 20, 24, 30, 50, 60, 96, 100, 120 a 200 tablet v lahvi

Blistr nebo strip: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 48, 50, 60, 100, 120, 200 a 400 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.